

Úloha 3

V konvexním čtyřúhelníku $ABCD$ platí $|\sphericalangle ABC| = |\sphericalangle CDA| = 90^\circ$. Bod H je patou kolmice z bodu A na přímkou BD . Body S, T leží po řadě na stranách AB, AD tak, že bod H je vnitřním bodem trojúhelníku SCT a platí

$$\begin{aligned}|\sphericalangle CHS| - |\sphericalangle CSB| &= 90^\circ, \\|\sphericalangle THC| - |\sphericalangle DTC| &= 90^\circ.\end{aligned}$$

Dokažte, že přímkou BD se dotýká kružnice opsané trojúhelníku TSH .

(Írán)

2. soutěžní den (9. 7. 2014)

Úloha 4

Na straně BC daného ostroúhlého trojúhelníku ABC leží body P a Q tak, že $|\sphericalangle PAB| = |\sphericalangle BCA|$ a $|\sphericalangle CAQ| = |\sphericalangle ABC|$. Body M a N leží po řadě na přímkách AP a AQ , přičemž bod P je středem úsečky AM a bod Q je středem úsečky AN . Dokažte, že přímkou BM a CN se protínají na kružnici opsané trojúhelníku ABC .

(Gruzie)

Úloha 5

Banka v Kapském Městě rází mince s hodnotou $\frac{1}{n}$ pro každé kladné celé číslo n . Mějme konečnou kolekci takových mincí (ne nutně různých hodnot), která má celkovou hodnotu nejvýše $99 + \frac{1}{2}$. Dokažte, že tuto kolekci je možné rozdělit na 100 nebo méně částí tak, aby každá část měla celkovou hodnotu nejvýše 1.

(Lucembursko)

Úloha 6

Říkáme, že přímkou v rovině jsou v *obecné poloze*, pokud žádné dvě nejsou rovnoběžné a žádné tři neprocházejí jedním bodem. Množina přímek v obecné poloze rozděluje rovinu na oblasti, z nichž některé mají konečný obsah; nazýváme je *konečné oblasti* příslušné dané množině přímek. Pro každé dostatečně velké n dokažte, že v libovolné množině n přímek

v obecné poloze je možné obarvit modře aspoň \sqrt{n} přímek tak, že žádná z příslušných konečných oblastí nebude mít celou hranici modrou.

Poznámka. Řešení, ve kterých bude tvrzení dokázáno s výrazem $c\sqrt{n}$ namísto \sqrt{n} , budou ohodnocena body v závislosti na hodnotě konstanty c .

(Rakousko – USA)

Podrobnější informace o letošním ročníku soutěže můžete najít na oficiálních stránkách IMO (www.imo-official.org).

Vedení českého týmu vyslovuje touto cestou poděkování za účinnou sponzorskou pomoc spojenou se zajištěním jednotného oblečení pro celé české družstvo na 55. IMO přerovské firmě PRECHEZA a.s. a dále brněnské společnosti NEOGENIA s.r.o.

Dodejme závěrem, že 56. ročník IMO se uskuteční v červenci 2015 ve druhém největším thajském městě Chiang Mai.

Jaromír Šimša

8. Středoevropská matematická olympiáda



Osmý ročník Středoevropské matematické olympiády (MEMO) se uskuteční ve dnech 18.–24. září 2014 v Drážďanech. Soutěže se již tradičně zúčastnilo 60 soutěžících z deseti středoevropských zemí (Švýcarsko, Německo, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko, Slovensko, Litva, Polsko a Česká republika). Každou zemi přitom reprezentovalo šestičlenné družstvo složené z žáků, kteří dosud nematurovali. Složení českého reprezentačního týmu bylo dáno výsledky ústředního kola 63. ročníku MO a omezujícím pravidlem MEMO, podle nichž nesmí být členové družstva pro MEMO ve stejném

roce současně členy národních reprezentančních týmů svých zemí na Mezinárodní MO (IMO).

Složení českého týmu na 8. MEMO bylo následující: *Libor Drozdek* (7/8 G L. Jaroše, Holešov), *Vojtěch Dvořák* (7/8 G Praha 1, Truhlářská), *Matěj Konečný* (7/8 G České Budějovice, Jiřovcova), *Karolína Kuchyňová* (3/4 G M. Lercha, Brno), *Marian Poljak* (6/8 G J. Škody, Přerov) a *Václav Rozhoň* (7/8 G J. V. Jirsíka, České Budějovice). Vedoucím české delegace a jejím zástupcem v jury byl *RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.*, z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, pedagogickým vedoucím byl *doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.*

Den před vlastním soutěžením provedla mezinárodní jury definitivní výběr všech 12 soutěžních úloh, a to po jedné z algebry, kombinatoriky, geometrie a teorie čísel pro soutěž jednotlivců a po dvou jiných z těchto oblastí pak pro soutěž družstev. Pro týmovou soutěž byla letos vybrána také jedna původní česká úloha (T-2), jejímž autorem byl *Pavel Calábek*. Zadání všech úloh pak vedoucí jednotlivých delegací přeložili do svých mateřských jazyků. Soutěž jednotlivců se konala v sobotu 20. září 2014 a soutěž družstev pak proběhla o den později. Po oba dny se soutěžilo v učebně Gymnasia Marie Curie v Drážďanech.

Následující dva dny probíhala koordinace soutěžních úloh za přítomnosti vedoucích národních týmů. Každá soutěžní úloha byla přitom hodnocena nejvýše 8 body (s celočíselným bodovacím schématem v rozpětí 0–8 bodů). Na poslední den pobytu v Drážďanech (úterý 23. září) připravili němečtí organizátoři pro všechny účastníky soutěže jednodenní výlet do nedalé Míšně (Meißen), kde všichni účastníci soutěže navštívili středověký hrad Albrechtsburg, který patří mezi nejkrásnější památky svého typu v Sasku.

Po návratu z Míšně byli na závěrečném slavnostním večeru oficiálně vyhlá-

šeni vítězové soutěže jednotlivců i soutěže družstev. V soutěži jednotlivců byly uděleny 3 zlaté, 11 stříbrných a 18 bronzových medailí. Je potěšitelné, že jedním ze tří držitelů zlaté medaile byl také náš reprezentant *Václav Rozhoň*, který se ziskem 29 bodů (z 32 možných) obsadil 3. příčku v absolutním pořadí jednotlivců, a stal se tak prvním českým reprezentantem který získal v osmileté historii MEMO zlatou medaili. Nejlepší dva soutěžící (z Chorvatska a z Maďarska) pak dosáhli maximálního bodového zisku. Tři naši reprezentanti – *Marian Poljak* (19 b.), *Vojtěch Dvořák* a *Matěj Konečný* (oba 18 b.) si z Drážďan přivezli domů bronzové medaile. Za zmínku stojí rovněž výborný výkon naší jediné dívky – *Karolíny Kuchyňové* (17 b.), která obdržela čestné uznání (za bezchybné vyřešení aspoň jedné úlohy), když jí bronzová medaile unikla o jediný bod. V soutěži družstev se našim již tolik nevedlo. Skončili na děleném 6. až 8. místě (společně s Rakouskem a Švýcarskem) se ziskem 34 bodů.

Podrobnější informace mohou zájemci nalézt na oficiálních stránkách 8. MEMO (www.memo2014.de).

Na závěr uvádíme texty všech soutěžních úloh. V závorce je uvedena země, která úlohu navrhla.

Soutěž jednotlivců

(20. září 2014)

Příklad I–1

Určete všechny funkce $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ takové, že pro všechna $x, y \in \mathbb{R}$ platí

$$\begin{aligned}xf(y) + f(xf(y)) - xf(f(y)) - f(xy) &= \\ &= 2x + f(y) - f(x + y).\end{aligned}$$

(Litva)

Příklad I–2

Uvažujme rozdělení pravidelného n -úhelníku na $n - 2$ trojúhelníků pomocí $n - 3$ jeho úhlopříček, které se neprotínají uvnitř tohoto n -úhelníku. *Dvojbarvnou triangulací* rozumíme takové roz-

dělení n -úhelníku, v níž je každý trojúhelník obarven černou nebo bílou barvou a každé dva trojúhelníky, které mají společnou stranu, jsou obarveny různými barvami. Přirozené číslo $n \geq 4$ nazveme *triangulární*, právě když tento pravidelný n -úhelník má dvojbarevnou triangulaci takovou, že pro každý jeho vrchol A je počet černých trojúhelníků s vrcholem A větší než počet bílých trojúhelníků se stejným vrcholem A .

(Chorvatsko)

Příklad I-3

Je dán trojúhelník ABC , v němž $|AB| < |AC|$ a I značí střed kružnice jemu vepsané. Nechtě E je takový bod strany AC , pro který platí $|AE| = |AB|$. Dále nechtě G je takový bod přímky EI , pro který platí $|\sphericalangle IBG| = |\sphericalangle CBA|$, přičemž I je vnitřním bodem úsečky EG .

Dokažte, že přímka AI , kolmice k přímce AE sestavená v bodě E a osa úhlu BGI se protínají v jednom bodě.

(Chorvatsko)

Příklad I-4

Pro libovolná celá čísla $n \geq k \geq 0$ definujeme *bibinomický koeficient* $\binom{n}{k}$ předpisem

$$\binom{n}{k} = \frac{n!!}{k!!(n-k)!!}.$$

Určete všechny dvojice (n, k) celých čísel, kde $n \geq k \geq 0$, takové, že odpovídající bibinomický koeficient je celé číslo.

Poznámka. Dvojný faktoriál $n!!$ je definován jako součin všech sudých čísel po n , je-li n sudé, a jako součin všech lichých čísel po n , je-li n liché. Např. $4!! = 2 \cdot 4 = 8$, $7!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 = 105$ a definujeme $0!! = 1$.

(Rakousko)

Soutěž družstev

(21. září 2014)

Příklad T-1

Určete nejmenší možnou hodnotu výrazu

$$\frac{1}{a+x} + \frac{1}{a+y} + \frac{1}{b+x} + \frac{1}{b+y},$$

kde a, b, x a y jsou kladná reálná čísla splňující nerovnosti

$$\frac{1}{a+x} \geq \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{a+y} \geq \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{b+x} \geq \frac{1}{2}$$

a

$$\frac{1}{b+y} \geq 1.$$

(Maďarsko)

Příklad T-2

Určete všechny funkce $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, které pro každé $x, y \in \mathbb{R}$ splňují podmínku $xf(xy) + xyf(x) \geq f(x^2)f(y) + x^2y$.

(Česká republika)

Příklad T-3

Nechtě K a L jsou daná přirozená čísla. Na pravoúhelníkové desce složené z $2K \times 2L$ jednotkových čtverců se pohybuje mravenec z levého dolního rohu do pravého horního rohu. V každém kroku se přesune vodorovně nebo svisle na sousední pole, přičemž na žádné pole nevstoupí více než jedenkrát. Na některá pole desky mravenec nemusí vstoupit. V určitých případech tvoří všechna nenavštívená pole jediný pravoúhelník, který nazveme *MEMO-pravoúhelník*.

Určete počet všech různých MEMO-pravoúhelníků.

Poznámka. Pravoúhelníky jsou různé, pokud nejsou tvořeny týmitž jednotkovými čtverci.

(Rakousko)

Příklad T-4

Ve Šťastném Městě žije 2014 obyvatel, které označíme $A_1, A_2, \dots, A_{2014}$. Každý z nich je v každém okamžiku buď *šťastný*, nebo *nešťastný*. Nálada každého obyvatele A se mění (z nešťastného na šťastného a naopak), právě když se jiný šťastný obyvatel usměje na A . V pondělí ráno bylo ve Šťastném Městě N šťastných obyvatel. Poté se v pondělí obyvatel A_1 usmál na A_2 , dále se A_2 usmál na A_3 atd., až nakonec se A_{2013} usmál na A_{2014} . Nikdo z nich se neusmál na žádného jiného kromě uvedeného obyvatele. Přesně totéž se opakovalo v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Ve

čtvrtek večer tak bylo ve městě právě 2000 šťastných obyvatel.

Určete největší možnou hodnotu N .
(Litva)

Příklad T-5

Je dán trojúhelník ABC , v němž $|AB| < |AC|$. Kružnice jemu vepsaná se dotýká stran BC , CA , AB po řadě v bodech D , E , F . Osa AI vnitřního úhlu při vrcholu A protíná přímkou DE a DF po řadě v bodech X a Y . Necht' Z značí patu výšky z vrcholu A .

Dokažte, že D je středem kružnice vepsané trojúhelníku XYZ .

(Slovinsko)

Příklad T-6

Kružnice k vepsaná trojúhelníku ABC se dotýká strany BC v bodě D . Přímkou AD protíná kružnici k v bodě $L \neq D$. Označme K střed kružnice vně připsané straně BC . Necht' M a N jsou po řadě středy úseček BC a KM .

Dokažte, že body B , C , N a L leží na téže kružnici.

(Slovensko)

Příklad T-7

Konečnou množinu A přirozených čísel nazveme *průměrovou*, právě když pro každou její neprázdnou podmnožinu je aritmetický průměr jejích prvků také přirozené číslo. Jinak řečeno, množina A je průměrová, právě když $\frac{1}{k}(a_1 + \dots + a_k)$ je přirozené číslo pro každé $k \geq 1$ a $a_1, \dots, a_k \in A$ jsou navzájem různá čísla.

Je dáno přirozené číslo n . Určete nejmenší možný součet prvků n -prvkové průměrové množiny.

(Rakousko)

Příklad T-8

Určete všechny uspořádané čtveřice (x, y, z, t) přirozených čísel, které vyhovují rovnici

$$20^x + 14^{2y} = (x + 2y + z)^{zt}.$$

(Litva)

Následující (9.) ročník MEMO se bude konat na základě oficiálního pozvání od 25. do 31. srpna 2015 ve slovinském Koperu.

Vedení českého reprezentačního týmu děkuje přerovské firmě MEOPTA za její sponzorskou pomoc při zajištění jednotného oblečení všech členů reprezentačního družstva na 8. MEMO.

Jaroslav Švrček

LITERATURA

Jaroslav Švrček:

Gradované řetězce úloh v práci s matematickými talenty

Univerzita Palackého v Olomouci vydala v roce 2014 pozoruhodnou publikaci *Gradované řetězce úloh v práci s matematickými talenty*, jejímž autorem je RNDr. Jaroslav Švrček, CSc.

Kniha je členěna do těchto kapitol:

1. Historie realizovaných matematických soutěží.
2. Vyhledávání a rozvoj matematických talentů.
3. Typy úloh pro matematické soutěže.
4. Gradované řetězce úloh v MO.
5. Další gradované řetězce matematických úloh.

Dodatky:

1. Z přípravy našich olympioniků.
2. Gradované řetězce úloh typu D.
3. O významu práce s talenty.

Pokládám tuto knihu za gradovanou monografií, neboť od účelného historického úvodu a didakticky zaměřených úvah o vyhledávání talentů dochází autor ke dvěma lokálním maximům práce: k typologii úloh a vymezení pojmu *gradovaný řetězec úloh* (s. 24). Za přirozené vyústění publikace považuji dodatek *O významu práce s talenty*, v němž významní matematikové