

Příloha časopisu
MATEMATIKA – FYZIKA – INFORMATIKA
Ročník 30 (2021), číslo 2

Úlohy I. kola (domácí část)
71. ročníku MO (kategorie A, B, C)

KATEGORIE A

A–I–1

Je možné vyplnit tabulku $n \times n$ jedničkami a dvojkami tak, aby byl součet čísel v každém řádku dělitelný pěti a součet čísel v každém sloupci dělitelný sedmi?

Řešte a) pro $n = 9$, b) pro $n = 12$.

(Tomáš Bárta)

A–I–2

Je dán lichoběžník $ABCD$ se základnami AB a CD . Označme k_1 a k_2 kružnice s průměry BC a AD . Dále označme P průsečík přímk BC a AD . Dokažte, že tečny z bodu P ke kružnici k_1 svírají stejný úhel jako tečny z bodu P ke kružnici k_2 .

(Patrik Bak)

A–I–3

Najděte všechna celá čísla $n > 2$ taková, že číslo n^{n-2} je n -tá mocnina celého čísla.

(Patrik Bak)

A–I–4

V oboru reálných čísel řešte soustavu rovnic

$$xy + 1 = z^2, \quad (1)$$

$$yz + 2 = x^2, \quad (2)$$

$$zx + 3 = y^2. \quad (3)$$

(Tomáš Jurík)

A–I–5

V různostranném trojúhelníku ABC označme I střed vepsané kružnice a k kružnici opsanou. Polopřímky BI a CI protnou kružnici k po řadě v bodech $S_b \neq B$ a $S_c \neq C$. Dokažte, že tečna ke kružnici k v bodě A , přímka vedená bodem I rovnoběžně se stranou BC a přímka $S_b S_c$ se protínají v jednom bodě.

(*Patrik Bak*)

A–I–6

Uvažujme nekonečnou posloupnost a_0, a_1, a_2, \dots celých čísel, která splňuje podmínky $a_0 \geq 2$ a $a_{n+1} \in \{2a_n - 1, 2a_n + 1\}$ pro všechny indexy $n \geq 0$. Dokažte, že každá taková posloupnost obsahuje nekonečně mnoho složených čísel.

(*Martin Melicher, Josef Tkadlec*)

KATEGORIE B

B–I–1

Pravoúhlý trojúhelník má celočíselné délky stran a obvod 11 990. Navíc víme, že jedna jeho odvěsna má prvočíselnou délku. Určete ji.

(*Patrik Bak*)

B–I–2

Nechť ABC je ostroúhlý trojúhelník s nejdelší stranou BC . Uvnitř stran AB a AC leží po řadě body D a E tak, že $|CD| = |CA|$ a $|BE| = |BA|$. Označme F takový bod, že $ABFC$ je rovnoběžník. Dokažte, že $|FD| = |FE|$.

(*Patrik Bak, Josef Tkadlec*)

B–I–3

Určete počet devítimístných čísel, v nichž se číslice 0 – 9 vyskytují nejvýše jednou a v nichž se součty číslic na 1. až 3. místě, na 3. až 5. místě, na 5. až 7. místě a na 7. až 9. místě všechny rovnají témuž číslu 10. Najděte rovněž nejmenší a největší z těchto čísel.

(*Jaroslav Zhouf*)

B–I–4

Určete počet reálných kořenů rovnice $x|x + 6A| = 36$ v závislosti na reálném parametru A .

(*Vojtech Bálint*)


B–I–5

Pravidelný n -úhelník označme $A_1A_2 \dots A_n$. Bod A_3 zobrazíme v osové souměrnosti s osou A_2A_4 , získáme bod A'_3 . Pak bod A'_3 zobrazíme v osové souměrnosti s osou A_1A_3 , získáme bod A''_3 . Pro která $n \geq 4$ je bod A''_3 totožný s průsečíkem přímk A_1A_2 a A_3A_4 ?

(Jaroslav Zhouf)

B–I–6

Je dána šachovnice $m \times n$, jejíž políčka jsou obarvena černě a bíle klasickým způsobem, přičemž levé horní políčko je černé. *Tahem* rozumíme vzájemnou výměnu dvou řádků nebo vzájemnou výměnu dvou sloupců šachovnice. *Skvrnou* rozumíme takovou neprázdnou množinu černých políček, která je tvořena všemi políčky, do nichž lze z jednoho jejího políčka přejít po cestě sestávající ze stran sousedících černých políček. Například na obrázku je šachovnice 4×4 s právě čtyřmi skvrnami.



V závislosti na přirozených číslech m a n určete, kolik nejméně skvrn může být na šachovnici $m \times n$ po provedení konečného počtu tahů.

(David Hruška)

KATEGORIE C

C–I–1

Na školní zahradě hraje skupina žáků hru zvanou molekuly. Učitel jim nejprve uložil, aby se rozdělili do trojic. Jeden žák přebyl, a tak z další hry vypadl. Zbylí žáci se pak měli rozdělit do čtveřic. Opět jeden žák přebyl a vypadl. Poté se zbylí žáci měli rozdělit do pětic, zase jeden žák přebyl a vypadl. Učitel nyní ukládá, aby se zbylí žáci rozdělili do šestic. Dokažte, že opět jeden žák přebyde.

(Josef Tkadlec)

C–I–2

Určete všechny četveřice různých dvojmístných přirozených čísel, pro které zároveň platí:

- (i) Součet těch čísel z dané četveřice, která obsahují číslici 2, je 80.
- (ii) Součet těch čísel z dané četveřice, která obsahují číslici 3, je 90.
- (iii) Součet těch čísel z dané četveřice, která obsahují číslici 5, je 60.

(Jaroslav Zhouf)

C–I–3

Uvnitř strany BC libovolného trojúhelníku ABC jsou dány body D , E tak, že $|BD| = |DE| = |EC|$, uvnitř strany AC body F , G tak, že $|AG| = |GF| = |FC|$. Uvažujme trojúhelník vymezený úsečkami AE , GD , BF . Dokažte, že poměr obsahu tohoto trojúhelníku a obsahu trojúhelníku ABC má jedinou možnou hodnotu, a určete ji

(Jaroslav Zhouf)

C–I–4

Tabulka 10×10 je vyplněna čísly 1 a -1 tak, že součet čísel v každém řádku až na jeden je roven nule a zároveň součet čísel v každém sloupci až na jeden je roven nule. Určete největší možný součet všech čísel v tabulce.

(Patrik Bak)

C–I–5

Je dán rovnostranný trojúhelník ABC a uvnitř jeho strany AB bod D . Na polopřímce opačné k BC uvažujme bod E takový, že $|CD| = |DE|$. Dokažte, že platí $|AD| = |BE|$.

(Jaroslav Švrček)

C–I–6

Určete všechny možné hodnoty součtu $a + b + c + d$, kde a , b , c , d jsou přirozená čísla splňující rovnost

$$(a^2 - b^2)(c^2 - d^2) + (b^2 - d^2)(c^2 - a^2) = 2021.$$

(Mária Dományová, Patrik Bak)