

Úlohy I. kola (domácí část)
74. ročníku MO (kategorie A, B, C)

KATEGORIE A


A–I–1

Předpokládejme, že pro reálná čísla a, b mají výrazy $a^2 + b$ a $a + b^2$ stejnou hodnotu. Jaká nejmenší může tato hodnota být?

(Patrik Bak)

A–I–2

Martin k sobě přikládá hrací kostky (stejně velikostí i rozmístěním čísel) tak, aby byly poskládané do tvaru čtverce libovolné velikosti a aby vždy na dvou přiléhajících bočních stěnách byla též čísla.



Kolik nejvíce různých čísel se může vyskytnout na horních stěnách kostek?

(Martin Panák, Josef Tkadlec)


A–I–3

Na tabuli jsou napsána navzájem různá přirozená čísla se součtem 2024. Každé z nich kromě nejmenšího je násobkem součtu všech menších napsaných čísel. Kolik nejvíce čísel může na tabuli být?

(Patrik Bak)

A–I–4

Pro trojúhelník ABC platí $|AB| = 13$, $|BC| = 14$, $|CA| = 15$. Jeho posunutím o vektor délky 1 vznikne trojúhelník $A'B'C'$. Určete nejmenší možný obsah průniku trojúhelníků ABC a $A'B'C'$.



(Tomáš Bárta)

A–I–5

Saba se snaží z přízemí nekonečně vysokého mrakodrapu dostat do n -tého patra pomocí zvláštního výtahu. Ve výtahu jsou tlačítka $0, 1, 2, \dots$. Po prvním stisknutí tlačítka pojede výtah nahoru a po každém dalším jede vždy opačným směrem, než posledně, přičemž po stisknutí tlačítka k popojede vždy o 2^k pater. Navíc každé další stisknuté tlačítko musí mít menší číslo než to předešlé. Dokažte, že Saba se do každého patra $n \geq 1$ může dostat právě dvěma různými postupy.

(Morteza Saghafian)

A–I–6

Označme I_A, I_B, I_C po řadě středy kružnic připsaných stranám BC, CA, AB trojúhelníku ABC . Průsečíky výšek trojúhelníků $I_A B C, A I_B C, A B I_C$ označme po řadě X, Y, Z . Dokažte, že trojúhelníky ABC a XYZ jsou shodné.

(Michal Janík)

KATEGORIE B


B–I–1

Z číslic 1 až 9 vytvoříme devítimístné číslo s navzájem různými číslicemi. Poté každou jeho dvojici po sobě jdoucích číslic interpretujeme jako dvojmístné číslo a na tabuli napíšeme jeho nejmenší prvočíselný dělitel. Můžeme tak na tabuli získat právě dvě různá prvočísla? Pokud ano, určete všechny takové dvojice prvočísel.

(Patrik Bak)

B–I–2

V trojúhelníku ABC platí $|\sphericalangle BAC| = 45^\circ$. Stranám AB a AC jsou vně připsány pravoúhlé rovnoramenné trojúhelníky ABP a ACN s přeponami AB a AC . Označme M střed úsečky PN . Dokažte, že úsečka AM má délku rovnou polovině poloměru kružnice opsané trojúhelníku ABC .



(Patrik Bak, Anastasia Bredichina)

B–I–3

Pro která přirozená čísla n lze rovnostranný trojúhelník se stranou délky n rozřezat na shodné dílky tvaru: a) \triangle , b) $\triangle\triangle$? Dílky jsou tvořeny rovnostrannými trojúhelníky se stranou délky 1.

(Pavel Calábek, Jaroslav Švrček)

B–I–4

a) Najděte příklad dvojmístného přirozeného čísla n takového, že číslo $1/n$ má ve svém desetinném zápise za desetinnou čárkou právě dvě číslice.

b) Dokažte, že pro každá dvě přirozená čísla k, l existují právě dvě kladná racionální čísla, která mají v desetinném zápise za desetinnou čárkou právě k číslic a jejich převrácené hodnoty právě l číslic.

(Desetinný zápis uvažujeme nejkratší možný.)

(Josef Tkadlec)

B–I–5

Označme k kružnici opsanou ostroúhlému trojúhelníku ABC . Její obraz v souměrnosti podle přímky BC protíná polopřímky opačné k BA a CA po řadě v bodech $D \neq B$ a $E \neq C$. Předpokládejme, že úsečky CD a BE se protínají na kružnici k . Určete všechny možné velikosti úhlu BAC .

(Patrik Bak)


B-I-6

Kladná reálná čísla x, y, z splňují nerovnosti $xy \geq 2, xz \geq 3, yz \geq 6$. Jakou nejmenší hodnotu může nabývat výraz $13x^2 + 10y^2 + 5z^2$?

(Patrik Bak)

KATEGORIE C**C-I-1**

List papíru ve tvaru obdélníku $ABCD$ o rozměrech $a \times b$, kde $a > b$, přeložíme jako na obrázku tak, že vrchol A splyne s bodem C . Zdůvodněte, proč pro obsah S výsledného pětiúhelníku $PBCQR$ platí $\frac{1}{2}ab < S < \frac{3}{4}ab$.



(Josef Tkadlec)

C-I-2


Přirozená čísla a, b jsou taková, že $a > b$, $a + b$ je dělitelné 9 a $a - b$ je dělitelné 11.

- Určete nejmenší možnou hodnotu čísla $a + b$.
- Dokažte, že čísla $a + 10b$ i $b + 10a$ musí být dělitelná 99.

(Jaromír Šimša)

C-I-3

Rámeček 2×3 lze rozdělit na čtverce 1×1 umístěním 7 zápalek jako na obrázku. Které rámečky $a \times b$, kde $a \leq b$, lze takto rozdělit pomocí právě 110 zápalek? Určete všechny možnosti.



(Josef Tkadlec)

C–I–4

Šachovnicově obarvenou tabulku 4×4 s černým levým horním polem vyplňujeme jedničkami a nulami. V každém čtverci 2×2 , který má černé levé horní pole, je stejný počet nul jako jedniček. Kolika různými způsoby lze tabulku vyplnit?

(*Ján Mazák*)

C–I–5

Nechť P, Q jsou po řadě středy stran BC, AC trojúhelníku ABC . Rovnoběžka s AC procházející středem K úsečky PQ protíná přímkou BQ v bodě L a přímkou PL protíná úsečku AC v bodě R . Dokažte, že R je středem úsečky AQ .

(*Jaroslav Švrček*)

C–I–6

Čtyřmístné číslo \overline{abcd} s nenulovými číslicemi nazveme *zrcadlitelné*, právě když přičtením devítinásobku nějakého trojmístného čísla zapsaného pomocí tří stejných číslic vznikne číslo \overline{dcba} . Kolik zrcadlitelných čísel existuje?

(*Mária Dományová, Patrik Bak*)